

Atenționare a Direcției Sanitar Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor Vrancea

2017-08-09 14:38:33



Urmare a notei de serviciu nr. 6798/03.08.2017 cu privire la confirmarea in municipiul Satu Mare la nivelul doua focare de PESTA PORCINA AFRICANA la porcii domestici, in vederea prevenirii acestei maladii, va prezentei veti acorda o atentie sporita respectarii interdictiei de a organiza targuri pentru vanzarea/cump

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vrancea

Urmare a notei de serviciu nr. 6798/03.08.2017 cu privire la confirmarea in municipiul Satu Mare la nivelul doua focare de PESTA PORCINA AFRICANA la porcii domestici, in vederea prevenirii acestei maladii, va prezentei veti acorda o atentie sporita respectarii interdictiei de a organiza targuri pentru vanzarea/cump. Mentionam ca proprietarii de suine sunt obligati sa anunte imediat pe medicul veterinar concesionar sau in caz de imbolnavire sau de mortalitate care apare la suine (poate fi anuntat si DSVSA Vrancea).

Va transmitem alaturat semnele clinice ale bolii:

Clinic boala poate evolua supraacut si acut; mai rar poate evolua subacut si cronic.

Moartea subita, cu putine semne clinice (in forma supraacuta moartea poate sa apara inainte de aparitia

Febra mare: 40,5-42 grade C, care se mentine 3-4 zile si sindrom hemoragipar;

Abatere, inapetenta, anorexie, pulsul accelerat si aritmic, dispnee, tuse, jetaj seros, sero-mucos sau sero-hemoragica;

Polidipsie, vomitari, constipatie urmata de diaree (uneori hemoragica);

Pielea urechilor cianotica, uneori pot aparea hematoame;

La nivelul partii inferioare a abdomenului, extremitatilor membrelor si cozii, pe fondul cianotic apar pete h

Cu 24-48 ore inainte de moarte, la un numar mare de animale, apar semne de meningoencefalita: agitatie, manej, retropulsie, pareze si paralizii;

Scroafele gestante avorteaza ;

Moartea apare in 5-13 zile, uneori 20 zile.